

LE THÉORÈME DE LEVELT

LOTFI SAIDANE

ABSTRACT. Let (E) a homogeneous linear differential equation of order n Fuchsien over $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. The idea of Riemann (1857) was to obtain the properties of solutions of (E) by studying the local system. Thus, he obtained some properties of Gauss hypergeometric functions by studying the associated rank 2 local system over $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{3 \text{ points}\}$. For example, he obtained the Kummer transformations of the hypergeometric functions without any calculation. The success of the Riemann's methods is due to the fact that the irreducible rank 2 local system over $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{3 \text{ points}\}$ are "rigid". Levelt theorem, see [2] Theorem 1.2.3 proves this result. In this work, we propose a partial generalization of this theorem.

RÉSUMÉ: Soit (E) une équation différentielle linéaire homogène Fuchsienne d'ordre n sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. L'idée de Riemann (1857) était d'obtenir les propriétés des solutions de (E) et ce en étudiant le système local associé. Ainsi, il obtient certaines propriétés des fonctions hypergénométriques de Gauss, en étudiant le système local d'ordre 2 sur $\mathbb{P}^1 \setminus \{3 \text{ points}\}$ associé. Par exemple, il retrouve les transformations de Kummer pour les fonctions hypergénométriques sans faire de calcul. La démarche de Riemann a abouti car le système local irréductible associé est linéairement "rigide". Le théorème de Levelt, voir [2] Théorème 1.2.3, prouve ce résultat. Dans ce travail, on propose une présentation légèrement différente et une généralisation partielle de ce théorème.

1. INTRODUCTION

En langage classique, un module différentiel sur un corps différentiel (K, ∂) est un K -espace vectoriel M de dimension finie sur K muni d'une application $\nabla_{\partial} : M \rightarrow M$ additive vérifiant :

$$f \in K, m \in M, \nabla_{\partial}(fm) = (\partial f)m + f(\nabla_{\partial}m).$$

Date: Juin 2009.

1991 *Mathematics Subject Classification.* 12H05.

Key words and phrases. opérateur hypergénométrique, monodromie, système linéairement rigide.

Je remercie le professeur D. Bertrand pour toutes les discussions concernant ce travail.

Le fait que la structure de module différentiel dépend de la dérivation de K conduit à des difficultés dans l'étude de certains problèmes de passage du locale au globale, comme par exemple le cas du problème de Riemann-Hilbert. On a, donc, besoin d'un concept de module différentiel beaucoup plus générale, ne dépendant pas de la paramétrisation choisie. Le langage moderne, pour l'étude analytique du problème de Riemann-Hilbert, utilise les concepts de fibré vectoriel et de système locale.

1.1. Connexion régulière. Soit X une surface de Riemann connexe. On désigne par $\mathcal{O}_X$ le schéma des fonctions holomorphes sur X . Un fibré vectoriel M de rang m sur X est un schéma de $\mathcal{O}_X$ -modules sur X localement isomorphe au schéma $\mathcal{O}_X^m$ de $\mathcal{O}_X$ -modules. On dit que M est un fibré trivial s'il est globalement (sur tout X) isomorphe à $\mathcal{O}_X^m$. Il est connu que tout fibré vectoriel sur une surface de Riemann connexe non compact est trivial. On appelle connexion (régulière) sur le fibré vectoriel M , tout morphisme de schémas de groupes

$$\nabla : M \rightarrow \Omega_X \otimes M,$$

vérifiant pour tout ouvert U et tout $f \in \mathcal{O}_X(U)$, $m \in M(U)$ la relation de Leibniz :

$$\nabla(fm) = df \otimes m + f\nabla(m).$$

Ainsi, si U est un ouvert et $t : U \rightarrow \{c \in \mathbb{C} ; |c| < 1\}$ est un isomorphisme, alors $\Omega_X(U)$ s'identifie à $\mathcal{O}_X(U)dt$ et $M(U)$ à $\mathcal{O}_X^m(U)$. L'application

$$\nabla(U) : M(U) \rightarrow \Omega_X(U)dt \otimes M(U)$$

est une connexion dans le sens classique.

Soit X un ouvert connexe d'une surface de Riemann $\mathbb{P}$, on suppose que l'infini n'appartient pas à X . La notion de connexion régulière (M, ∇) sur X peut être définie d'une manière élémentaire. On identifie le fibré vectoriel M avec $\mathcal{O}_X^m$, le schéma des fonctions holomorphes avec $\mathcal{O}_X dz$. Cependant ∇ est déterminé par son action sur $M(X)$, c'est à dire par $\nabla \frac{d}{dz}$ sur $M(X)$. Il existe, alors une matrice A à coefficients fonctions holomorphes sur X tel que (M, ∇) est complètement déterminé sur X par $\frac{d}{dz} + A$. La connexion régulière (M, ∇) sur X est, alors, équivalente à $(\mathcal{O}_X^m, \frac{d}{dz} + A)$.

1.2. Fibré vectoriel algébrique. Les fibrés vectoriels sur une surface de Riemann ont été classifiés par Birkhoff et Grothendieck voir [7], [11]. Pour tout entier n , on définit le fibré en droite $\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(n)$ de la manière suivante: soit $U_0 = \mathbb{P} \setminus \{0\}$ et $U_\infty = \mathbb{P} \setminus \{\infty\}$, alors la restriction de $\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(n)$ à U_0 et U_∞ est libre et engendrée par e_0 et e_∞ vérifiant sur

$U_0 \cap U_\infty$ la relation $z^n e_0 = e_\infty$. Un résultat principal montre que tout fibré vectoriel sur la sphère de Riemann est isomorphe à une somme direct de la forme

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}}(n_1) \oplus \dots \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}}(n_r),$$

où les n_i sont des entiers naturels vérifiant $n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_r$. La suite $(n_1, n_2, \dots, n_r)$ détermine le type du fibré M .

D'un point de vue algébrique, en associant à la surface de Riemann $\mathbb{P}$ la droite projective complexe $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, on peut définir les notions de fibrés vectoriels et connections (algébrique), les théorèmes "GAGA" fournissent une équivalence entre les fibrés vectoriels algébriques et analytiques. Soit X un ouvert propre, pour la topologie de Zariski, de la droite projective $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. on désigne par $\mathcal{O}_X$ son algèbre affine (le schéma des fonctions régulières sur X). Soit M un fibré vectoriel de rang m sur $\mathbb{P}^1$. La restriction de M à X constitue un fibré libre, en particulier $M(X)$ est un $\mathcal{O}_X$ -module libre de rang m . La $\mathcal{O}_X$ -algèbre des opérateurs différentiels sur X , qu'on note $D = D_X$, est engendrée par une dérivation ∂ de $\mathcal{O}_X$. On appelle D -module tout $\mathcal{O}_X$ -module libre de type fini V , qui est muni d'une action ∂_V de ∂ vérifiant les propriétés suivantes:

$$\partial_V(u + v) = \partial_V(u) + \partial_V(v),$$

$$\partial_V(fu) = \partial(f)u + f\partial_V(u), \text{ pour tout } u, v \text{ dans } V \text{ et tout } f \text{ dans } \mathcal{O}_X.$$

Dans une base B de V sur $\mathcal{O}_X$, ∂_V est représenté par un opérateur $\partial + A_{(B)}$, où $A_{(B)}$ est une matrice carré à coefficients dans $\mathcal{O}_X$. On note $H^*(V)$ le groupe de cohomologie du complexe de deRham algébrique $0 \rightarrow V \rightarrow V \rightarrow 0$ défini par $\partial_{(V)}$. Le groupe $H^0(V)$ est formé des sections horizontales (globales), tandis que $H^1(V)$ s'identifie au conoyau de $\partial_{(V)}$. Pour plus de détails, ainsi que les démonstrations des deux lemmes suivants, voir [3] §.1.

Soient V et V' deux D -modules, on note V^* , le D -module $\text{Hom}(V, \mathcal{O}_X)$, de sorte qu'un morphisme de V dans V' est une section horizontale (globale) du D -module $V' \otimes V^*$. Une extension de V par V' est une suite exacte

$$0 \rightarrow V' \rightarrow E \rightarrow V \rightarrow 0$$

dans la catégorie des D -modules, par abus de langage, on la notera encore E . L'ensemble $\text{Ext}_D(V, V')$ des classes d'isomorphismes d'extensions de V par V' est muni d'une structure de groupe, qui vérifie:

Lemme 1. (Coleman): *Les groupes $\text{Ext}_D(V, V')$ et $H^1(V' \otimes V^*)$ sont canoniquement isomorphe.*

Lorsque $V' = \mathcal{O}_X$ (muni de sa connexion canonique). On déduit du lemme précédent que $\text{Ext}_D(V, \mathcal{O}_X)$ est canoniquement isomorphe

à $H^1(V^*)$ qui a une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{C}$ (corps de base). Dans le lemme suivant $h^1(V^*)$ désigne la dimension de $H^1(V^*)$ et $h^0(V^*)$ la dimension de $H^0(V^*)$ sur $\mathbb{C}$, S est l'ensemble des points à l'infini de X , et $Irr(V)$ la somme des irrégularités aux différents points à l'infini de S .

Lemme 2. *Si V est un D -module de rang n . Alors: $h^1(V^*) = (\text{card}S - 2)n + Irr(V) + h^0(V^*)$. En particulier, si V est un module irréductible non isomorphe à O_X (resp. si $V = O_X$), il existe exactement $(\text{card}S - 2)n + Irr(V)$ (resp. $\text{card}S - 1$) extension de V par O_X linéairement indépendante sur $\mathbb{C}$.*

1.3. D-Module. Soit M un élément unitaire de $D = O_X[\partial]$, l'action de ∂ sur le O_X -module D/DM , en fait un D -module qu'on note $V(M)$. Les puissances positives ou nulles de ∂ , constitue la base canonique de $V(M)$. Le dual de $V(M)$ est isomorphe à D/DM^* , où M^* désigne l'opérateur adjoint de M . Les solutions de l'équation différentielle $M(y) = 0$ s'identifient aux vecteurs horizontaux du D -module $V(M^*) = D/DM^*$. Par abus d'écriture on notera de la même manière l'équation différentielle et l'opérateur différentiel associé.

Soit $M = L'L$ un opérateur décomposé, où L' et L sont deux opérateurs de D d'ordres strictement positif. Il définit une extension:

$$(1.1) \quad E(L, L') : 0 \longrightarrow V(L') \longrightarrow V(M) \longrightarrow V(L) \longrightarrow 0.$$

Le O_X -module libre de type fini $V(M)/V(L')$ étant isomorphe à $V(L)$. On choisit la section s du O_X -module $V(L)$ vers $V(M)$, qui envoie un élément u de $V(L)$ sur lui même. En désignant par $B(L)$ et $B(L')$ les bases canoniques respectives de $V(L)$ et $V(L')$. L'ensemble $\{B(L')L, B(L)\}$ constitue une base de $V(M)$. Si $L = a_0 + a_1\partial + \dots + a_r\partial^r + \partial^{r+1}$ et $L' = b_0 + b_1\partial + \dots + b_{r'}\partial^{r'} + \partial^{r'+1}$, alors l'action de ∂ sur $V(L)$, est représenté par la matrice:

$$A_{(L)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_r \end{pmatrix},$$

l'action de ∂ sur $V(L')$ est représenté par la matrice,

$$A_{(L')} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -b_0 \\ 1 & 0 & -b_1 \\ 0 & 1 & -b_{r'} \end{pmatrix},$$

et l'action de ∂ sur $V(M)$ est alors représenté par la matrice:

$$A_{(M)} = \begin{pmatrix} (A_{(L')}) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (A_{(L)}) \end{pmatrix}.$$

Soit S la matrice de s relativement aux bases respectives $B(L)$ et $\{B(L')L, B(L)\}$ de $V_{(L)}$ et $V_{(M)}$. La matrice S est alors égale à $\begin{pmatrix} (0) \\ I_r \end{pmatrix}$, où I_r désigne la matrice identité d'ordre r . On a, par exemple, si $M = (\partial - \alpha)(\partial - \beta)$, alors $A_{(L)} = (\beta)$, $A_{(L')} = (\alpha)$, $A_{(M)} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Soit u un élément de $V(L)$. On note $(u_1, \dots, u_r)$ ses composantes dans la base $B(L)$. En posant

$$\Psi_{(M)} = \partial_{(M)}s - s\partial_{(L)},$$

le vecteur $\Psi_{(M)}(u)$ est représenté par :

$$\begin{aligned} \Psi_{(M)}(u) &= \partial_{(M)} \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ 0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{pmatrix} - S(\partial_{(L)} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{pmatrix}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ 0 \\ u'_1 \\ \vdots \\ u'_r \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (A_{(L')}) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (A_{(L)}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ 0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{pmatrix} \\ &\quad - \begin{pmatrix} (0)_{r' \times r} \\ I_r \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} u'_1 \\ \vdots \\ u'_r \end{pmatrix} + A_{(L')} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_r \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} u_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

d'où

$$\Psi_{(M)}(u) = (u_r, 0, \dots, 0).$$

L'application $\Psi_{(M)}$ est un O_X -morphisme de $V(L)$ vers $V(L')$ envoyant le dernier vecteur de $B(L)$ vers le premier vecteur de $B(L')$. La classe de $\Psi_{(M)}$ dans $H^1(V_{(L')} \otimes V_{(L^*)})$ ne dépend pas du choix de s , ni du représentant de $V_{(M)}$ dans $Ext_D(V_{(L)}, V_{(L')})$.

1.4. Monodromie. Soit S un sous-ensemble fini de $\mathbb{C}$, pour $\alpha \in S$, soit $A_\alpha \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on suppose que $\sum_{\alpha \in S} A_\alpha = 0$. On pose

$$A = \sum_{\alpha \in S} \frac{A_\alpha}{z - \alpha}.$$

On considère le système différentiel linéaire :

$$(A) \quad \frac{d}{dz} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = 0.$$

Ce système est singulier régulier sur la droite projective complexe $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Il admet des solutions globales multiformes sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$. L'ensemble de ces solutions constituent un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel V de dimension n . Soit $z_0 \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$, l'action du groupe fondamental $\pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S, z_0)$ sur V fournit la représentation

$$\rho : \pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S, z_0) \rightarrow GL(V),$$

appelée représentation de monodromie du système (A). Du fait que le groupe $\pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S, z_0)$ est engendré par les classes de lacets $(\gamma_\alpha)_{\alpha \in S}$, partant de z_0 puis faisant un tour, dans le sens direct, autour de α , dans un voisinage ne rencontrant pas $S \setminus \{\alpha\}$, vérifiant la relation (moyennant un ordre convenable de S) :

$$\prod_{\alpha \in S} \gamma_\alpha = 1.$$

La représentation ρ est déterminée par la donnée d'un ensemble de matrices $(M_\alpha)_{\alpha \in S}$ de $GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant

$$(M) \quad \prod_{\alpha \in S} M_\alpha = 1$$

La collection $(M_\alpha)_{\alpha \in S}$ constitue un système locale (complexe) d'ordre n sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$, c'est à dire un schéma d'espaces vectoriels complexe localement isomorphe au schéma constant $\mathbb{C}^n$. Inversement, soit $(M_\alpha)_{\alpha \in S}$ un ensemble fini de matrices de $GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant la relation $\prod_{\alpha \in S} M_\alpha = 1$. Le problème de Riemann-Hilbert pour les systèmes d'équations différentielles consiste à demander si cette collection de matrices peut être obtenue de la même manière que précédemment, c'est à dire la représentation de monodromie d'un système différentiel à pôles simples en S du type (A).

En 1913, Plemelj et Birkoff [6] réalise la représentation ρ comme représentation de monodromie d'un système à singularités régulières et obtiennent une

réponse positive en supposant que l'un des M_α est diagonalisable. En 1928 Lappo-Danileskii [17] écrit explicitement les solutions de (A) sous forme de série de polylogarithmes, sa réponse est affirmative dans le cas où les matrices M_α sont suffisamment proche de l'identité. Le point de vue moderne, initié par Röhrl [18], consiste à étudier les fibrés holomorphes muni d'une connexion sur une surface de Riemann X . Si S est un sous-ensemble fini non vide de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ et $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$, alors le fibré est trivial, de sorte qu'une section s'identifie à une fonction holomorphe de X dans $\mathbb{C}^n$. Il existe, alors, une application holomorphe $A : X \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que les sections horizontales du fibré correspondent aux solutions du système différentiel $Y' = AY$. Les sections horizontales multiformes constituent un espace vectoriel V de dimension n , sur lequel le groupe fondamental $\pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S)$ opère. La représentation $\rho : \pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S) \rightarrow GL(V)$ est la représentation de monodromie associée au fibré muni de sa connexion. Le théorème d'existence des solutions des systèmes d'équations différentielles fournit l'équivalence entre la catégorie des fibrés holomorphes sur X muni d'une connexion et la catégorie des représentations de $\pi_1(X)$. En particulier, toute représentation de $\pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S)$ est la représentation de monodromie de $Y' = AY$, où A est holomorphe sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$. Deligne [9] montre que toute représentation de $\pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S)$ est la représentation de monodromie d'un système $Y' = AY$, méromorphe sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ et admettant des singularités régulières aux points de S . Enfin, Dekkers [10] montre qu'on a une réponse positive au problème dans le cas $n = 2$.

La situation est différente pour les équations différentielles linéaires scalaires. En effet, soit $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}(z)$. On considère l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre n suivante :

$$(E) \quad y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0.$$

On dit que $\alpha \in \mathbb{P}^1$ est une singularité régulière de (E) si toute solution de (E) est à croissance polynômiale au voisinage de α . Il est connu (voir [13]), que α est une singularité régulière de (E) si et seulement si il existe au moins un $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que α soit un pôle d'ordre i pour a_i . On dit que l'équation (E) est Fuchsienne si et seulement si toutes ses singularités sont régulières. Un calcul simple montre qu'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre n ayant s singularités régulières dans $\mathbb{P}^1$, dépend de $\frac{n(n(s-2)+s)}{2}$ paramètres complexes. En revanche, la représentation de monodromie de $\pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{s \text{ points}\})$ dépend de $n^2(s-2) + 1$ paramètres. Les deux quantités précédentes sont égales si et seulement si ($n = 1$ et s quelconque) ou ($n = 2$ et $s = 3$). Dans ces conditions on peut retrouver l'équation différentielle à partir de la représentation de monodromie. Dans le cas général on

ne peut pas obtenir n'importe quelle représentation de monodromie comme représentation de monodromie d'une équation du type de (E) . Ainsi, étant donné un sous-ensemble fini non vide S de $\mathbb{P}^1$ et une collection $(M_\alpha)_{\alpha \in S}$ de matrices de $GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant $\prod_{\alpha \in S} M_\alpha = 1$, il existe toujours une équation différentielle linéaire régulière sur $\mathbb{P}^1 \setminus \Sigma$, où $\Sigma \supseteq S$, et singulière régulière aux points de S , les éléments éventuels de $\Sigma \setminus S$ sont des singularités apparentes pour l'équation.

L'idée de Riemann (1857) était d'obtenir les propriétés des solutions d'une équation différentielle linéaire fuchsienne d'ordre n par l'étude du système local fournit par le prolongement analytique au voisinage des différentes singularités régulières d'une base de solutions localement holomorphe. Ainsi, il obtient certaines propriétés des fonctions hypergéométriques de Gauss, en étudiant le système local d'ordre 2 sur $\mathbb{P}^1 \setminus \{3 \text{ points}\}$ qui leur est associé. Il retrouve les transformations de Kummer pour les fonctions hypergéométriques sans faire de calcul. La démarche de Riemann a abouti car le système local irréductible utilisé est linéairement "rigide".

On considère l'équation (E) , soit Σ l'ensemble, non vide, de ses singularités régulières dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. On suppose que (E) est régulière sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \Sigma$. On suppose pour tout point singulier la différence de deux exposants n'est jamais entière. Ce qui se traduit par le fait que les matrices de monodromie locale possèdent des valeurs propres distinctes. La rigidité se traduit par le fait, que si on se donne une équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{C}(z)$ régulière sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \Sigma$, ayant des singularités régulières sur Σ , on suppose que l'équation indicelle en tout point de Σ est la même que celle associée à (E) , alors la monodromie locale est isomorphe.

On appelle groupe de monodromie, l'image par la représentation de monodromie du groupe fondamental en un point base $z_0 \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$. A conjugaison près, c'est un sous-groupe bien défini de $GL_n(\mathbb{C})$. Le groupe de monodromie est un sous-groupe du groupe de Galois différentiel. Si les singularités de l'équation sont toutes régulières, l'adhérence de Zariski du groupe de monodromie remplit le groupe de Galois différentiel. Soit K le corps des fonctions rationnelles sur X . On note $D_K = K[\partial]$ l'anneau des opérateurs différentiels à coefficients dans K . Pour les applications que nous avons prévues on prendra $K = \mathbb{C}(z)$. Tout D -module V définit, par extension des scalaires un D_K -module, qu'on notera V_K , ou encore V (s'il n'y a pas de risque de confusion).

2. OPÉRATEURS HYPERGÉOMÉTRIQUES

Soient n un entier naturel supérieur ou égal à 2 et $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n$ des nombres complexes. On pose $\theta = z \frac{d}{dz}$, $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et $\underline{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$. On appelle opérateur hypergéométrique (généralisé) d'ordre n et de paramètres $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n$ l'opérateur :

$$D(\underline{\alpha}, \underline{\beta}) = (\theta + \beta_1 - 1) \dots (\theta + \beta_n - 1) - z(\theta + \alpha_1) \dots (\theta + \alpha_n).$$

L'équation différentielle $D(\underline{\alpha}, \underline{\beta})u = 0$ est appelée équation hypergéométrique généralisée d'ordre n , elle est régulière sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1, \infty\}$. Les points $0, 1, \infty$ étant des singularités régulières pour l'équation. Les exposants locaux en ces points sont:

$1 - \beta_1, \dots, 1 - \beta_n$ en $z = 0$; $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ en $z = \infty$ et $0, 1, \dots, n - 2, -1 + \sum_{j=1}^{j=n} (\beta_j - \alpha_j)$ en $z = 1$.

Si les nombres complexes β_i sont distincts modulo $\mathbb{Z}$. L'équation hypergéométrique possède n solutions en zéro linéairements indépendantes données par:

$$z^{1-\beta_i} {}_nF_{n-1}(1+\alpha_1-\beta_i, \dots, 1+\alpha_n-\beta_i; 1+\beta_1-\beta_i, \dots, 1+\tilde{\beta}_i-\beta_i, \dots, 1+\beta_n-\beta_i),$$

pour $i = 1, \dots, n$.

Le théorème de Pochhammer montre que l'équation hypergéométrique possède $n - 1$ solutions holomorphes linéairement indépendante au voisinage de $z = 1$.

Les résultats suivants, qui existent, en partie dans [5], nous seront utiles pour la suite de ce paragraphe.

Proposition 1. *Pour tout δ dans $\mathbb{C}$ on a:*

$$(\theta + \delta - 1)D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n) = D(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \delta; \beta_1, \dots, \beta_n, \delta)$$

et

$$D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)(\theta + \delta) = D(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \delta; \beta_1, \dots, \beta_n, \delta + 1).$$

Preuve. Il suffit de remarquer que pour tout δ dans $\mathbb{C}$ on a: $(\theta + \delta - 1)z = z(\theta + \delta)$. $\square$

Corollaire 1. *On a:*

$$\begin{aligned} & D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)(\theta + \alpha_j - 1) \\ &= (\theta + \alpha_j - 1)D(\alpha_1, \dots, \alpha_j - 1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n), \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} & D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)(\theta + \beta_j) \\ &= (\theta + \beta_j - 1)D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_j + 1, \dots, \beta_n). \end{aligned}$$

L'opérateur $D(\underline{\alpha}, \underline{\beta})$ est dit réductible dans l'anneau $\mathbb{C}(z)[\theta]$, s'il peut s'écrire comme produit de deux opérateurs de l'anneau $\mathbb{C}(z)[\theta]$ d'ordre strictement positif. Soient D_1 et D_2 deux opérateurs différentiels de $\mathbb{C}(z)[\theta]$ d'ordre strictement positif, soit K une extension de Picard-Vessiot de $\mathbb{C}(z)$ contenant les extensions de Picard-Vessiot correspondantes aux équations différentielles $D_1(u) = 0$ et $D_2(u) = 0$, on désigne par G le groupe de Galois différentiel de K . On dira que les opérateurs D_1 et D_2 sont rationnellement équivalents si les espaces des solutions respectifs sont des G -modules isomorphes, ou encore, s'ils existent deux opérateurs, D_3 dans $\mathbb{C}(z)[\theta]$ sans facteur commun à droite avec D_1 , et D_4 dans $\mathbb{C}(z)[\theta]$ tels que: $D_2 D_3 = D_4 D_1$. Autrement dit, l'opérateur D_3 réalise un isomorphisme entre les espaces des solutions des équations $D_1(u) = 0$ et $D_2(u) = 0$.

Poursuivant 1.1, soit L un opérateur d'ordre strictement positif de $\mathbb{C}(z)[\theta]$, on suppose qu'il s'écrit sous la forme $L = \prod_{i=1}^r L_i$, où les L_i sont des opérateurs d'ordre strictement positifs irréductibles. Alors, on obtient une suite de Jordan-Hölder de module différentielle sur $\mathbb{C}(z)$, telle que chaque facteur est équivalent au module différentielle associée à L_i . Ainsi, si pour tout i on a L_i est équivalent à L'_i , alors, L est équivalent à $L' = \prod_{i=1}^r L'_i$. L'une des difficultés dans la décomposition d'un opérateur, voir ??, ??, réside dans le fait que si l'un des opérateurs L_i est réductible, alors on ne peut plus continuer le processus de décomposition à équivalence près sans considération de tout l'opérateur. On a, par exemple,

$$\begin{aligned} D(0, 0, -2; 1, 1, -1) &= \theta^2(\theta - 2) - z.\theta^2(\theta - 2) \\ &= (1 - z).[\theta(\theta - 2)].\theta. \end{aligned}$$

L'opérateur $\theta(\theta - 2)$ est équivalent à $(\theta - 1).(\theta - 2)$, en revanche, $D(0, 0, -2; 1, 1, -1) = (1 - z).[\theta(\theta - 2)].\theta$ n'est pas équivalent à $\theta(\theta - 1)(\theta - 2)$.

Les différentes décompositions d'un opérateur hypergéométrique réductibles, fournissent des informations pour le calcul de son groupe de Galois différentiel. On a, par exemple, si l'opérateur hypergéométrique L s'écrit

$$L = \prod_i (\theta + \alpha_i) L_L \prod_j (\theta + \beta_j),$$

où L_L est Lie-irréductible. Le groupe de Galois différentiel peut-être calculé par des extensions successives de groupes, voir ?? p. 301, elle montre que sous certaines conditions ces groupes sont indépendants de la décomposition de l'opérateur L et que le groupe $H^u = \text{Gal}_{diff}(E_L/E_P E_{L_L} E_Q)$, où $P = \prod_i (\theta + \alpha_i)$, $Q = \prod_j (\theta + \beta_j)$, E_M est une extension de Picard-Vessiot attachée à M et $E_P E_{L_L} E_Q$ est un compositum des extensions

de Picard-Véssiot, est aussi "gros" que possible. Par exemple, si L (d'ordre n) est équivalent à un produit du type $(\theta + \alpha)(\theta + \alpha')L_L$, alors H^u est isomorphe à $\mathbb{C}^{2(n-2)}$.

Proposition 2. *Pour tout entier s dans $\mathbb{Z}$, $D(\alpha_1 + s, \dots, \alpha_n + s; \beta_1 + s, \dots, \beta_n + s)$ est rationnellement équivalentes à $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)$.*

Preuve. Soit $s \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\begin{aligned} & D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n) z^s \\ &= z^s D(\alpha_1 + s, \dots, \alpha_n + s; \beta_1 + s, \dots, \beta_n + s) \end{aligned}$$

Du fait que z^s est sans facteur en commun à droite avec $D(\alpha_1 + s, \dots, \alpha_n + s; \beta_1 + s, \dots, \beta_n + s)$, on obtient le résultat. $\square$

Proposition 3. *L'opérateur $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)$ est réductible si et seulement s'il existe au moins i et j dans $\{1, 2, \dots, n\}$ tels que $\alpha_i - \beta_j$ est un entier relatif.*

Preuve. Ce résultat est démontré dans [2], corollaire 1.2.2, on ne reprend que la démonstration de la condition suffisante. On considère les ensembles

$$P_0 = \{(i, j) \text{ tel que } \beta_j - \alpha_i \in \mathbb{Z}_{>0}\}$$

et

$$P_1 = \{(i, j) \text{ tel que } \beta_j - \alpha_i \in \mathbb{Z}_{<0}\}.$$

Si $P_0 \cup P_1 = \{\emptyset\}$, il existe alors au moins i et j dans $\{1, \dots, n\}$ tel que $\beta_j = \alpha_i$. Moyennant une permutation on peut supposer que $\beta_n = \alpha_n$. De la proposition 1, on déduit l'égalité

$$D(\underline{\alpha}, \underline{\beta}) = (\theta + \alpha_n - 1) D(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}; \beta_1, \dots, \beta_{n-1}).$$

Si $P_0 \neq \{\emptyset\}$, on pose

$$n_0 = \inf_{(i,j) \in P_0} \{\beta_j - \alpha_i\}.$$

On peut supposer que $\beta_n - \alpha_n = n_0$, on écrit $\beta_n = \alpha_n + 1 + n_0 - 1$. Si $n_0 = 1$, l'opérateur $D(\underline{\alpha}, \underline{\beta})$ est réductible par la proposition 1. Si $n_0 \geq 2$, comme $\beta_n - \alpha_i \geq n_0$ pour tout i , alors $\alpha_n + 1 - \alpha_i \notin \{0, -1, \dots, 2 - n_0\}$. Du lemme 3, on déduit que $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \alpha_n + 1 + n_0 - 1)$ est rationnellement équivalent à $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \alpha_n + 1)$ qui est réductible.

Si $P_1 \neq \{\emptyset\}$. On pose

$$n_1 = \sup_{(i,j) \in P_1} \{\beta_j - \alpha_i\}.$$

Un raisonnement analogue au précédent conduit à la conclusion. $\square$

Corollaire 2. Soit $a, b, c \in \mathbb{C}$. Alors l'opérateur hypergéométrique

$$z(z-1)\left(\frac{d}{dz}\right)^2 + [(a+b+1)z-c]\frac{d}{dz} + ab$$

est réductible dans $\mathbb{C}(z)\left[\frac{d}{dz}\right]$ si et seulement si a ou b ou $a-c$ ou $b-c$ est un entier relatif.

Proof. On pose $\theta = z\frac{d}{dz}$. On a :

$$\theta^2 = z^2 \left(\frac{d}{dz}\right)^2 + z\frac{d}{dz},$$

ce qui entraîne

$$\begin{aligned} z \left\{ z(z-1)\left(\frac{d}{dz}\right)^2 + [(a+b+1)z-c]\frac{d}{dz} + ab \right\} &= \theta(\theta+c-1) - z(\theta+a)(\theta+b) \\ &= D(a, b; 1, c), \end{aligned}$$

on applique, alors, la proposition précédente pour conclure. $\square$

Proposition 4. Tout opérateur de $\mathbb{C}(z)[\theta]$ rationnellement équivalent à un opérateur réductible est réductibles dans $\mathbb{C}(z)[\theta]$.

Preuve. Soient D_1 et D_2 deux opérateurs de $\mathbb{C}(z)[\theta]$, de même ordre strictement positif. On désigne par V_i , $i = 1, 2$, l'espace des solutions, dans une extension de Picard-Vesiot convenable, de l'équation différentielle $D_i u = 0$. Soit G son groupe de Galois différentiel, alors l'opérateur D_1 est réductible si et seulement si il existe un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel non trivial G -invariant strictement inclu dans V_1 . Alors l'image, par l'équivalence rationnelle, de ce sous-espace, est un sous-espace G -invariant de V_2 , ce qui prouve que D_2 est réductible. $\square$

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n$ des nombres complexes vérifiant l'ensemble $\{(i, j) \mid \alpha_i - \beta_j \in \mathbb{Z}\}$ est non vide. On se propose de donner quelques propriétés de l'opérateur hypergéométrique $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)$. Soit $E = \{(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2 \mid \alpha_i - \beta_j \in \mathbb{Z}\}$, E est non vide. On pose $E = E_0 \cup E_+ \cup E_-$, où $E_0 = \{(i, j) \in E \mid \alpha_i = \beta_j\}$, $E_+ = \{(i, j) \in E \mid \alpha_i - \beta_j \in \mathbb{Z}_{>0}\}$ et $E_- = \{(i, j) \in E \mid \alpha_i - \beta_j \in \mathbb{Z}_{<0}\}$. On pose $t = \inf_{(i,j) \in E_-} \{\beta_j - \alpha_i\}$ et $s = \sup_{(i,j) \in E_+} \{\beta_j - \alpha_i\}$. On ordonne l'ensemble $(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)$ de la manière suivante : On commence par représenter les α_i tels que $(i, j) \in E_0$, ordonné par $\operatorname{Re}(\alpha_i)$, puis les α_i tels que $(i, j) \in E_-$ et $(i, j) \notin E_0$, ordonnés selon la croissance des $\beta_j - \alpha_i$, puis les α_i tels que $(i, j) \in E_+$ et $(i, j) \notin E_0 \cup E_-$.

ordonné par la décroissance des $\alpha_i - \beta_j$ et enfin les α_i tels que $(i, j) \notin E$. Ainsi, on écrit :

$$D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n) = D(\alpha_{i_j})$$

vérifiant :

$$\begin{aligned} \alpha_{1_1} &= \alpha_{1_2} = \dots = \alpha_{1_{r_1}} = \beta_{1_1} = \beta_{1_2} = \dots = \beta_{1_{s_1}} \\ &\dots\dots\dots \\ \alpha_{i_0_1} &= \alpha_{i_0_2} = \dots = \alpha_{i_0_{r_{i_0}}} = \beta_{j_0_1} = \beta_{j_0_2} = \dots = \beta_{j_0_{s_{j_0}}} \\ \alpha_{i_1_1} + t &= \dots = \alpha_{i_1_{r_{i_0}}} + t = \beta_{j_1_1} = \beta_{j_1_2} = \dots = \beta_{j_1_{s_{j_1}}} \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Ainsi, voir ?? p. 317, s'il existe (exactement) s indices distincts $i_1, \dots, i_s$ et (exactement) s indices distincts $j_1, \dots, j_s$ tels que

$$k \in \{1, \dots, s\}, \quad \alpha_{i_k} - \beta_{j_k} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

et

$$\begin{aligned} \alpha_{i_1} - \beta_{j_1} &= \inf_{(i,j) \in E_0 \cup E_+} (\alpha_i - \beta_j) \\ t &\in \{2, \dots, s\}, \quad \alpha_{i_t} - \beta_{j_t} = \inf_{\substack{(i,j) \in E_0 \cup E_+ \\ i \notin \{i_1, \dots, i_{t-1}\} \\ j \notin \{j_1, \dots, j_{t-1}\}}} (\alpha_i - \beta_j) \end{aligned}$$

alors il existe s nombres α'_k tels que $\alpha'_k - \beta_{j_k} \in \mathbb{Z}$ et l'opérateur $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)$ est équivalent à

$$\prod_{i \in \{1, \dots, s\}} (\theta + \alpha'_i - 1) D(\{\alpha_i\}_{i \notin \{i_1, \dots, i_s\}}; \{\beta_i\}_{j \notin \{j_1, \dots, j_s\}}).$$

En revanche, on a le resultat classique suivant, voir [5] corollaire 2.6, est une conséquence du lemme précédent.

Proposition 5. *Si $\beta_j - \alpha_i \notin \mathbb{Z}$ pour tout indice i et j dans $\{1, \dots, n\}$, alors l'opérateur $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \beta_1, \dots, \beta_n)$ est rationnellement équivalents à $D(\alpha_1 + t_1, \dots, \alpha_n + t_n; \beta_1 + s_1, \dots, \beta_n + s_n)$, où $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$, sont des entiers relatifs quelconques.*

3. RIGIDITÉ (VOIR [16], [2])

Soit $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ et $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}(z)$. On considère l'équation différentielle linéaire homogène d'ordre n sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ suivante :

$$(E) \quad y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0.$$

On désigne par $S = \{\varpi_1, \dots, \varpi_s\}$ l'ensemble, non vide, de ses singularités (dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$) qu'on suppose toutes régulières. On fixe un point base $z_0 \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$ et on désigne par G le groupe fondamental $\pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S, z_0)$. Alors G est un groupe libre engendré par les classes d'homotopies de lacets γ_i partant de z_0 , faisant un tour dans le sens

direct de ϖ_i , dans un voisinage ne contenant aucun ϖ_j , $j \neq i$, puis revenant à z_0 , tels que

$$\prod_{i \in \{1, \dots, s\}} \gamma_i = 1.$$

Du fait que z_0 est un point régulier pour l'équation (E) , les conditions de cauchy sont satisfaites, par conséquent, il existe n solutions (locales) de (E) holomorphes au voisinage de z_0 , linéairement indépendante sur $\mathbb{C}$. Soit V le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel constitué par ces solutions. La représentation

$$M_{(E)} : \pi_1(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S, z_0) \rightarrow GL(V),$$

est appelée représentation de monodromie de (E) . Pour $i \in \{1, \dots, s\}$, on pose $M_i = M_{(E)}(\gamma_i)$. Alors, $M_i \in GL_n(\mathbb{C})$ et

$$\prod_{i \in \{1, \dots, s\}} M_i = I_n.$$

Les matrices M_i sont appelés matrice de monodromie (locale), elles constituent un système locale (complexe) d'ordre n sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus S$. Le groupe engendré par les matrices M_i est appelé "groupe de monodromie" de (E) , lié à la base de de solutions locales en z_0 .

Question : Si on change la base de solution locale, alors le noiveau groupe de monodromie est-il isomorphe à l'ancien? En d'autres termes : Le système locale définie par les M_i est-il "linéairement rigide"? Soient $r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ et $g_1, g_2, \dots, g_r$ des éléments de $GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant

$$g_1 \cdot g_2 \dots g_r = Id_n$$

On dit que le r -uplet $\{g_1, g_2, \dots, g_r\}$ est linéairement rigide, si pour tout conjugués $\tilde{g}_1, \tilde{g}_2, \dots, \tilde{g}_r$ de $g_1, g_2, \dots, g_r$ dans $GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant:

$$\check{g}_1 \check{g}_2 \dots \check{g}_r = Id_n,$$

il existe u dans $GL_n(\mathbb{C})$ tel que $\check{g}_i = u g_i u^{-1}$ pour $i = 1, 2, \dots, r$. A titre d'exemple, le couple (g, g^{-1}) , $g \in GL_n(\mathbb{C})$, est linéairement rigide.

Le groupe $\langle g_1, \dots, g_r \rangle$ est irréductible si et seulement il agit irréductiblement sur $\mathbb{C}^n$. Katz [16] théorème 1.1.2, a crastérisé les formes normales de Jordan des systèmes locaux irréductibles linéairement rigides. Le théorème de Levelt, [2] théorème 1.2.3, montre que le système local associé à une équation hypergéométrique irréductible est linéairement rigide. Le but de ce paragraphe est de généraliser en partie le théorème de Levelt.

Dfinition 1. On dit que $h \in GL(n, \mathbb{C})$ est une pseudo-reflection si le rang de $(h - Id_n)$ est égal à 1.

Lemme 3. Soit $n, p \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ et $A_1, A_2, \dots, A_p \in GL_n(\mathbb{C})$ tels que pour tout $i, j \in \{1, 2, \dots, p\}$, $i < j$, on ait $A_i A_j^{-1}$ est une pseudo-reflection. Alors $A_1, A_2, \dots, A_p$ possèdent $(n - 1)$ lignes ou colonnes communes.

Proof. On fera une démonstration pour $p = 3$, le cas général étant similaire. On suppose que $n \geq 3$.

On pose $W_1 = \ker(A_1 - A_2)$ et $W_2 = \ker(A_2 - A_3)$. Du fait que $A_1 A_2^{-1}$ et $A_2 A_3^{-1}$ sont des pseudo-reflections, on déduit que W_1 et W_2 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^n$ de dimension $n - 1$. Si $W_1 = W_2$, on choisit une base de W_1 qu'on complète, par un vecteur, en une base de l'espace total. Relativement à cette base les matrices A_1, A_2 et A_3 ont les même $(n - 1)$ première colonnes.

On suppose que $W_1 \neq W_2$. Du fait que $n \geq 3$, l'espace vectoriel $W_1 \cap W_2$ est de dimension $n - 2$. Soit $\{e_1, \dots, e_{n-2}\}$ une base de l'espace $W_1 \cap W_2$.

* Si $A_1 A_2^{-1}$ est une reflection, il existe, alors, e_n tel que $(A_1 - A_2)(e_n) = \nu e_n$, avec $\nu \neq 0$. On choisit e_{n-1} dans W_1 de sorte que $\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ soit une base de W_1 . Le système $\underline{e} = \{e_1, \dots, e_n\}$ constitue, alors, une base de $\mathbb{C}^n$. Pour $i \in \{1, 2, 3\}$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, On désigne par $A_{i,j}$, la j -ème colonne, par rapport à la base $\underline{e}$, de la matrice A_i . Du fait que $\text{rang}(A_1 - A_3) = \text{rang}(A_2 - A_3) = 1$ et $W_1 \neq W_2$, ils existent λ et β non nuls dans $\mathbb{C}$ tels que

$$A_{1,n-1} - A_{3,n-1} = \lambda(A_{1,n} - A_{3,n})$$

et

$$A_{2,n-1} - A_{3,n-1} = \beta(A_{2,n} - A_{3,n}).$$

On a, par hypothèse $A_{1,n-1} = A_{2,n-1}$ et $A_1 e_n = A_2 e_n + \nu e_n$. En remplaçant ces relations dans les égalités précédentes, on obtient, par abus d'écriture,

$$\lambda(A_{2,n} + \nu e_n - A_{3,n}) = \beta(A_{2,n} - A_{3,n}).$$

Par conséquent, il existe au moins $\alpha \in \mathbb{C}$, $\alpha \neq 0$ tel que

$$A_{2,n} - A_{3,n} = \alpha e_n,$$

ce qui entraîne

$$A_{1,n-1} - A_{3,n-1} = \lambda \alpha e_n,$$

et prouve que les $(n - 1)$ premières ligne des matrices A_1, A_2 et A_3 sont identiques.

* Si $A_1 A_2^{-1}$ est idempotente (n'admet que 1 comme valeur propre), alors, l'image de $A_1 - A_2$ est contenue dans son noyau W_1 . Soit w un générateur de $\text{Im}(A_1 - A_2)$, il existe, alors, un vecteur e_n dans $\mathbb{C}^n$ tel que $(A_1 - A_2)e_n = w$. Si $w \in W_1 \cap W_2$, on pose $e_1 = w$ de sorte que $\{e_1, \dots, e_{n-2}\}$ soit une base de l'espace $W_1 \cap W_2$. On choisit e_{n-1} dans W_1 tel que $\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$ soit une base de W_1 . Le système $\underline{e} = \{e_1, \dots, e_n\}$

constitue, alors, une base de $\mathbb{C}^n$. Si $w \notin W_1 \cap W_2$, on pose $e_{n-1} = w$. Ainsi, il existe un unique indice $m \in \{1, n-1\}$, tel que $w = e_m$. Dans ces conditions, les $(n-1)$ première colonnes de $A_1 - A_2$ sont nulles et la dernière colonne est égale à e_m . Les $(n-2)$ premières colonnes de $A_1 - A_3$ et de $A_2 - A_3$ sont nulles. En écrivant que $A_1 - A_3$ et $A_2 - A_3$ sont de rang 1, on obtient que toutes les composantes de leurs deux dernières colonnes, sauf la m -ième ligne sont nulles. Par conséquent, à l'exception de la m -ième ligne, toutes les lignes de A_1 , A_2 et A_3 sont identiques.

Si $n = 2$ et $W_1 \neq W_2$. On refait le même raisonnement en remplaçant $W_1 \cap W_2$ par $\{0\}$. $\square$

Les deux resultats suivants modifient l'énoncé et généralisent, en partie, le théorème 1.2.1 de [2].

Thorme 1. *Soit $n, p \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ et $A_1, A_2, \dots, A_p \in M_n(\mathbb{C})$ ayant $(n-1)$ colonnes (ou lignes) communes et une valeur propre en commun. Alors ces matrices stabilisent au moins une droite ou un hyperplan de $\mathbb{C}^n$.*

Proof. On remarque qu'un système de matrices stabilisent un même hyperplan si et seulement si leurs transposées, comme endomorphisme de l'espace dual, stabilisent une même droite, autrement dit ils possèdent un vecteur propre en commun. Sans perte de généralités, on pourra supposer que les $(n-1)$ premières lignes des matrices A_i sont identiques. Si λ désigne la valeur propre commune, alors les matrices $A_1 - \lambda I_n$, $A_2 - \lambda I_n$, ..., $A_p - \lambda I_n$ ont les même $(n-1)$ premières lignes et sont de rang inférieur ou égal à $n-1$:

- Si les $(n-1)$ premières lignes de ces dernières matrices sont linéairement indépendantes, alors la dernière ligne de chacune de ces matrices sera combinaison linéaire des précédentes. Soit v un vecteur non nul orthogonal à ces $(n-1)$ première lignes. Alors v est orthogonal à la dernière ligne de chacune de ces matrices. Ainsi, v est un vecteur propre commun, de valeur propre λ , des matrices $A_1, \dots, A_p$.

- Si les $(n-1)$ premières lignes de ces matrices sont linéairement dépendantes. Alors leurs transposées ont $(n-1)$ colonnes communes linéairement dépendantes. Soit $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}$ les coefficients d'une relation de dépendance linéaire, non triviale, entre ces colonnes. Alors, le vecteur $v = (c_1, c_2, \dots, c_{n-1}, 0)$ est un vecteur propre commun de toutes les matrices $A_1^T, \dots, A_p^T$ de valeur propre λ . Par conséquent, les matrices $A_1, \dots, A_p$ stabilisent simultanément un hyperplan.

Si les matrices $A_1, \dots, A_p$ possèdent $(n-1)$ colonnes communes, leurs transposées possèdent, alors, $(n-1)$ lignes communes et le raisonnement précédent conduit à la conclusion. $\square$

Thorme 2. Soit $n, p \in \mathbb{N}_{\geq 2}$, $A_1, A_2, \dots, A_p \in M_n(\mathbb{C})$ ayant $(n-1)$ lignes (ou colonnes) communes et stabilisent un même sous-espace non trivial de $\mathbb{C}^n$. Alors, $\cap_{i=1}^p \text{spec} A_i \neq \emptyset$.

Proof. On peut supposer que, relativement à une certaine base $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{C}^n$, les matrices $A_1, \dots, A_p$ ont les même $(n-1)$ premières colonnes. On désigne par E le sous-espace de $\mathbb{C}^n$ engendré par $\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$. Soit W un sous-espace vectoriel non trivial de $\mathbb{C}^n$ stable sous l'action des A_i . On suppose que $W \subset E$ et que $\dim_{\mathbb{C}} W = r \in \{1, \dots, n-1\}$. Soit $\{w_1, \dots, w_r\}$ une base de W , qu'on complète de sorte que $B' = \{w_1, \dots, w_n\}$ soit une base de $\mathbb{C}^n$. Du fait que $A_i e_j = A_k e_j$, pour $i, k \in \{1, \dots, p\}$ et $j \in \{1, \dots, n-1\}$, on déduit que

$$A_i w_j = A_k w_j, \text{ pour } i, k \in \{1, \dots, p\} \text{ et } j \in \{1, \dots, r\},$$

ce qui prouve, compte tenue de la stabilité de W , que relativement à la base B' les matrices A_i sont de la forme

$$A_i = \begin{pmatrix} A_{(r,r)} & *_{(r,n-r)} \\ o & *_{(n-r,n-r)} \end{pmatrix},$$

où $A_{(r,r)}$ est une matrice d'ordre r commune à tous les A_i , $*_{(r,n-r)}$ (resp. $*_{(n-r,n-r)}$) est un élément de $M_{(r,n-r)}(\mathbb{C})$ (resp. $M_{(n-r,n-r)}(\mathbb{C})$). Par conséquent, le polynôme $\det(A_{(r,r)} - \lambda I_r)$ divise tous les polynômes caractéristiques de tous les A_i . Les racines complexes de $\det(A_{(r,r)} - \lambda I_r)$ sont dans $\cap_{i=1}^p \text{spec} A_i$.

On suppose que $W \not\subset E$, il existe, alors, une base $\{f_{n-p+1}, \dots, f_n\}$ de W et un système libre $\{g_1, \dots, g_{n-p}\}$ de E tel que $\{g_1, \dots, g_{n-p}, f_{n-p+1}, \dots, f_n\}$ soit une base de $\mathbb{C}^n$. Relativement à cette base les matrices A_i sont de la forme :

$$A_i = \begin{pmatrix} A_{(n,n-p)} & 0 \\ *_{(p,p)} \end{pmatrix},$$

où $A_{(n,n-p)}$ est une matrice ayant n lignes et $(n-p)$ colonnes commune à tous les A_i et $*_{(p,p)}$ est une matrice d'ordre p . Ainsi, on déduit que les A_i possèdent au moins une valeur propre commune. $\square$

Corollaire 3 (Beukers Théorème 1.2.1). Soit H un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ engendré par deux matrices A et B vérifiant AB^{-1} est une pseudo-reflection. Alors, H est linéairement irréductible si et seulement si, les spectres de A et de B sont disjoints.

Proof. Le lemme 3 pour $p = 2$, montre que A et B possèdent $(n-1)$ lignes ou colonnes communes. Les théorèmes 1 et 2 permettent de conclure. $\square$

Le résultat suivant modifie légèrement et généralise, en partie, le théorème de Levelt au cas $p \geq 2$ (voir [2] théorème 1.2.3).

Thorme 3. Soit $n, p \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ et $\alpha_i = \{\alpha_{i,1}, \dots, \alpha_{i,n}\} \subset \mathbb{C}^*$, $1 \leq i \leq p$, vérifiant $\cap_{i=1}^p \alpha_i = \emptyset$. Alors il existe $A_1, A_2, \dots, A_p$ dans $GL_n(\mathbb{C})$ ayant $(n-1)$ colonnes en commun, unique à conjugaison près par un même isomorphisme, vérifiant, pour tout i , $\text{spec} A_i = \alpha_i$.

Proof. Existence :

Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, n\}$, on définit $A_{i,j}$ par

$$\prod_{j=1}^n (X - \alpha_{i,j}) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} A_{i,n-k} X^k,$$

du fait que les $\alpha_{i,j}$ sont non nuls, les matrices définient par

$$A_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -A_{i,n} \\ 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & -A_{i,1} \end{pmatrix},$$

sont dans $GL(n, \mathbb{C})$ de polynôme caractéristique

$$\begin{aligned} \det(XI_n - A_i) &= X^n + \sum_{k=0}^{n-1} A_{i,n-k} X^k \\ &= \prod_{j=1}^n (X - \alpha_{i,j}). \end{aligned}$$

ce qui prouve l'existence.

Unicité :

Soit $A_1, A_2, \dots, A_p \in GL(n, \mathbb{C})$ ayant $(n-1)$ colonnes en commu. On pourra supposer que les $(n-1)$ première colonnes des matrices A_i sont identiques. Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base de $\mathbb{C}^n$ par rapport à laquelle on a, pour $i, j \in \{1, \dots, p\}$, $k \in \{1, \dots, n-1\}$:

$$A_i e_k = A_j e_k.$$

On désigne par W le sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^n$ engendré par $\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$. On a :

$$\dim_{\mathbb{C}}(W \cap A_1 W \cap \dots \cap A_1^{n-2} W) \geq 1.$$

On suppose que la dimension de $W \cap A_1 W \cap \dots \cap A_1^{n-2} W$ est supérieur ou égal à 2. Par conséquent, on a

$$\dim_{\mathbb{C}}(W \cap A_1 W \cap \dots \cap A_1^{n-1} W) \geq 1.$$

D'où, le sous-espace $W \cap A_1 W \cap \dots \cap A_1^{n-1} W$ de $\mathbb{C}^n$ est non trivial et stable sous l'action de tous les A_i . Le théorème 2 montre que $\cap_{i=1}^p \text{spec} A_i \neq \emptyset$ ce qui est absurde. Ainsi,

$$\dim_{\mathbb{C}}(W \cap A_1 W \cap \dots \cap A_1^{n-2} W) = 1,$$

il existe, alors, un vecteur v dans W tel que le système $\{v, A_1 v, \dots, A_1^{n-2} v\}$ constitue une base de W , qu'on complète par un vecteur en une base

de l'espace total $\mathbb{C}^n$. Relativement à cette dernière les matrices A_i sont de la forme

$$A_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -A_{i,n} \\ 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & -A_{i,1} \end{pmatrix},$$

où les $A_{i,j}$ sont déterminés par le spectre $\{\alpha_{i,1}, \dots, \alpha_{i,n}\}$ de A_i de la manière suivante :

$$\prod_{j=1}^n (X - \alpha_{i,j}) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} A_{i,n-k} X^k,$$

ce qui termine la preuve. $\square$

REFERENCES

- [1] Beauville, A., "Monodromie des systèmes différentiels linéaires à pôles simples sur la sphère de Riemann", Séminaire N. Bourbaki, 1992-1993, exp. n° 765, 103-119, (1993).
- [2] Beukers, F., "hypergeometric functions in one variable", manuscrit, 14 Avril 2006.
- [3] Bertrand, D., "Extensions de D-modules et groupes de Galois différentiels", Springer L.N.1454, 1990, 125-141.
- [4] Bertrand, D., "Unipotent radicals of differential Galois groups", institut de mathématiques de jussieu, prépublication 239, Février 2000.
- [5] Beukers, F.; Heckman, G., "Monodromy for the hypergeometric function ${}_nF_{n-1}$ ", Invent.math. 95, 325-354 (1989).
- [6] Birkhoff, G., "The generalized Hilbert problem for linear differential equations and the allied problem for linear difference and q-difference equations", Proc. Amer. Acad. 49, 521-568, (1913).
- [7] Birkhoff, G., "Collected Mathematical Papers", volume 1. Dover Publications, New York, 1968.
- [8] Boussel, K., "Opérateurs hypergéométriques réductibles: décomposition et groupes de Galois différentiels", Ann. Fac. Sc. Toulouse, 5, 299-362, 1996.
- [9] Deligne, P., "Equations différentielles à points singuliers réguliers, Lecture Notes in Math. 163, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York (1970)
- [10] Dekkers, W., "The matrix of a connection having regular singularities on a vector bundle of rank 2 on $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ ", Lecture Notes in Math., 712, 33-43, , Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, (1979).
- [11] Grothendieck, A., "Sur la classification des fibrés holomorphes sur la sphère de Riemann", Amer. J. Math., 79:121-138, 1957.
- [12] Hille, E., "Ordinary Differential Equations In The Complex Plane", Pure & Applied Mathematics, A Wiley- Interscience Series Of Texts, Monographs & Tracts.
- [13] Ince, E. L., "Ordinary Differential Equations", Dover Publications, New York, 1956.
- [14] Katz, N. M., "On the calculation of some differential Galois groups", Invent. Math., 87, pp 13-61, 1987.
- [15] Katz, N. M., "Exponential sums and differential equations", Princeton University Press, 1991.

- [16] Katz, N. M., "Rigid Local Systems", Annals of Math. Studies 139, Princeton 1996.
- [17] Lappo-Danilevskii, I., "Mémoire sur la théorie des systèmes des équations différentielles linéaires", Chelsea, New York (1953).
- [18] Röhl, H., "Das Riemann-Hilbertsche Problem der Theorie der linearen Differentialgleichungen. Math. Annalen 133, 1-25, (1957)
- [19] Van der Put, M., "reduction modulo p of differential equations", indag. Mathem., N.S., 7 (3), 367-387.
- [20] Van der Put, M., Singer, S., "Galois theory of linear differential equations", Springer-Verlag GmbH, janvier 2003
- [21] Varadarajan, V. S., "Meromorphic differential equations", Expo. Math. 9 (1991), 97-188.

LOTFI SAIDANE, DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES, FACULTÉ DES SCIENCES
DE TUNIS, CAMPUS UNIVERSITAIRE, 1060 TUNIS, TUNISIE.

E-mail address: lotfi.saidane@fst.rnu.tn